

## 肺炎医生报告结局量表

尊敬的医生：

请从您自己的角度，针对您所医治患者近 **3天内** 的病情状况进行评价。量表中每个问题都有五个选项，请您对每一个问题进行判断、打分。如果您对某个问题不能做出肯定的回答，请选择与您认为最接近的那个答案。请尽量回答所有问题。这份量表填写可能会占用您几分钟时间。谢谢您的参与！

内 容		计分	分 级	描 述	评分
临 床 症 状	<b>A1.</b> 咳 嗽	1	无	无咳嗽	__分
		2	轻 度	每天咳嗽 4~5 次	
		3	中 度	每天咳嗽 6~12 次	
		4	重 度	每小时咳嗽 1~3 次	
		5	极重度	阵发咳嗽每小时多于 3 次，影响睡眠	
	<b>A2.</b> 咯 痰	1	无	无咯痰	__分
		2	轻 度	黏液样；清稀至白色	
		3	中 度	黏液脓性的；多呈白色兼黄；每天少于 15ml	
		4	重 度	脓性的；黄色至绿色；每天 15~45ml	
		5	极重度	脓性的或血色的；每天 45ml 以上	
	<b>A3.</b> 呼吸 困难	1	无	无胸闷、气短	__分
		2	轻 度	只有超过日常体力活动强度后才胸闷、气短，休息后感觉舒服	
		3	中 度	日常体力活动后胸闷、气短，休息后感觉舒服。	
		4	重 度	稍做日常体力活动后就胸闷、气短，休息后感觉舒服	
		5	极重度	总是胸闷、气短，甚至休息也有	
	<b>A4.</b> 胸 痛	1	无	无胸痛	__分
		2	轻 度	偶有疼痛；不需要药物止痛	
		3	中 度	咳嗽或深呼吸时疼痛；需要 OTC 药物止痛	

体 征		4	重 度	正常呼吸时疼痛；影响睡眠；需要 OTC 药止痛	
		5	极重度	每次呼吸时疼痛；需要处方止痛药物	
	<b>A5.</b>	1	无	无食欲减退，食量正常	__分
	食欲减退	2	轻 度	较日常稍差，不影响饮食量	
		3	中 度	食欲较差，影响饮食量	
		4	重 度	食欲差，明显影响饮食量	
		5	极重度	食欲很差，不能进食	
	<b>A6.</b>	1	无	无乏力	__分
	乏 力	2	轻 度	只有超过日常体力活动后感觉乏力	
		3	中 度	日常体力活动后感觉乏力	
		4	重 度	稍有日常体力活动后就感乏力	
		5	极重度	总有乏力，甚至休息也感觉乏力；不能进行日常体力活动	
	<b>A7.</b>	1	无	意识清楚	__分
	意识障碍	2	轻 度	嗜 睡	
		3	中 度	淡漠或躁动	
	4	重 度	昏 睡		
	5	极重度	昏 迷		
<b>B1.</b>	1	正 常	体温正常	__分	
体 温	2	轻 度	体温在 37.3 <sup>0</sup> C~38 <sup>0</sup> C		
	3	中 度	体温在 38.1 <sup>0</sup> C~39 <sup>0</sup> C		
	4	重 度	体温在 39.1 <sup>0</sup> C~40 <sup>0</sup> C，或≤36 <sup>0</sup> C		
	5	极重度	体温持续在 40 <sup>0</sup> C 以上，或≤35 <sup>0</sup> C		
<b>B2.</b>	1	正 常	16~19 次/分	__分	
呼吸频率	2	轻 度	20~24 次/分		
	3	中 度	25~29 次/分		
	4	重 度	30~34 次/分		
	5	极重度	≥35 次/分		
<b>B3.</b>	1	正 常	60~100 次/分	__分	

心 率	2	轻 度	101~120 次/分	
	3	中 度	121~140 次/分	
	4	重 度	141~160 次/分	
	5	极重度	> 160 次/分	
<b>B4.</b> 收缩压	1	正 常	血压正常	__分
	2	轻 度	低血压 (< 80mmHg)	
	3	中 度	短期 (≤1h) 内扩容和/或缩血管后血压可正常	
	4	重 度	持续 (4h 以内) 用缩血管药来维持血压正常	
	5	极重度	持续 (4h 以内) 用缩血管药后血压仍低	
<b>B5.</b> 湿啰音	1	无	未闻及	__分
	2	轻 度	可闻及单侧肺部局限性湿啰音	
	3	中 度	可闻及双肺局限性湿啰音	
	4	重 度	可闻及单侧肺部广泛性湿啰音	
	5	极重度	可闻及双肺广泛性湿啰音	
<b>病情改善</b> <b>综合评价* (C1)</b>	1 恢复正常或病前状态      2 明显改善      3 稍有改善 4 无明显变化                      5 加 重			__分
*注：综合评价：由医生根据患者症状、体征及相关检查结果等，对患者病情改善情况进行总体评价。				